


19344
3 cop.

El deshoje y despunte en plátano y banano,

una alternativa para el manejo de la sigatoka negra y amarilla.

ISBN 958-96720-3-5



PRONATTA
Programa Nacional de Transferencia
de Tecnología Agropecuaria



Cartilla ilustrada N° 2



19344
3 cop.

Pereira, Agosto de 1999

Para realizar el deshoje y despunte en plátano y banano.

- ✓ *Corte las hojas afectadas por sigatoka negra y amarilla, lo mismo que las hojas secas y verdes quebradas.*

- ✓ *Corte solo la porción enferma de las hojas poco afectadas.*



Aspectos que se deben tener en cuenta al realizar el deshoje y despunte.



- ✓ *Para deshojar utilice una media luna o un machete recortado y con buen filo por los dos lados.*

- ✓ *Desinfecte la herramienta con hipoclorito de sodio a 20%, cada vez que pase de una planta a otra.*

- ✓ *Al deshojar, deje adherida a la planta la mayor parte del peciolo o rama que sostiene la hoja de la planta.*





- ✓ *Deje las hojas cortadas en el suelo y en medio de las calles, éstas sirven para controlar las malezas.*

- ✓ *Deshoje y despunte cada mes si su plantación ésta afectada por sigatoka amarilla y cada 15 días si está afectada por sigatoka negra.*

Para realizar el deshoje y despunte

tenga en cuenta que:

- ✓ *Como mínimo debe dejar ocho hojas verdes hasta que la planta florezca, así producirá racimos comerciales.*



Para obtener racimos de calidad comercial en plátano y banano.

- ✓ *Utilice semilla que provenga de plantaciones bien administradas.*
- ✓ *Fertilice el cultivo de acuerdo con las recomendaciones del técnico.*
- ✓ *Controle las malezas (arvences) sobre todo alrededor de la planta (plateo).*