

# RAZAS CRIOLLAS

ROMOSINUANO, BLANCO OREJINEGRO, COSTEÑO CON CUERNOS,  
HARTON DEL VALLE, SAN MARTINERO, CASANAREÑO



# » ROMOSINUANO

El ganado romosinuano deriva su nombre de la ausencia de cuernos (Romo) y del lugar de origen, Valle del río Sinú, Costa Norte de Colombia.

Es de tamaño mediano y cuerpo cilíndrico, pelaje amarillo claro (bayo) o rojo cereza (araguato) uniforme y/o manchado (pataconeado).

Sobresale por su fertilidad (superior al 80%), longevidad (40% de las vacas con más de 10 partos), mansedumbre, producción de carne de alta calidad (terneza inferior a 4,3 kg fuerza) y por su habilidad combinatoria con el cebú, mejorando los índices de (precocidad -edad al sacrificio inferior a 28 meses-, natalidad y fertilidad), su rendimiento en canal es superior al 53%. Por estas características es la raza criolla más apetecida en el exterior.

El Romo es la base genética criolla de la raza sintética Velázquez.



## » BLANCO OREJINEGRO (BON)

Es una raza originada en la zona comprendida entre Santafé de Antioquia al norte y Popayán al sur a lo largo del Río Cauca y en los departamentos de Huila, Caldas y Antioquia y actualmente en el Piedemonte llanero. Ubicada generalmente entre altitudes que van de los 800 a 1.800 msnm entre 18 y 24°C. El origen de estos ganados es el sur de España y es posible que esté más ligado a algunos ganados grises de las estepas de Europa occidental, el mismo que dio origen al ganado White Park de Inglaterra. Este animal tiene como características la epidermis y mucosas pigmentadas, pelaje blanco o blanco y negro entremezclados. Generalmente se considera como una raza de triple fin (leche, carne y trabajo).

En cuanto a las características productivas, se han registrado pesos promedio al nacimiento de  $28 \pm 1,5$  kg, pesos al destete de  $165 \pm 23$  kg y pesos a los 18 meses de  $225 \pm 36$  kg. En cuanto a la edad al primer parto se ha reportado 38,64 meses y en comparación con otras razas lecheras se encuentra una tasa de fecundidad de 75,3% (Corpoica).

Conocido también como ganado antioqueño, esta raza es de temperamento dócil, gran fortaleza y habilidad para caminar por terrenos escarpados como las zonas montañosas de la región andina. En ausencia del ternero, la vaca Bon inhibe la bajada de la leche y acorta el periodo de lactancia lo que podría interpretarse como excelente habilidad materna. Posee además buenos resultados en combinación con la raza cebú para producir híbridos de excelentes características cárnicas. Se han registrado valores de rendimiento en canal superiores al 54%. En el cruce de toros BON con vacas de raza Holstein, se producen unos híbridos de buena capacidad productiva (producción promedio superior a 10 L/vaca/día), además de mejorar notablemente la calidad de la leche aumentando en forma considerable los sólidos totales, que han registrado valores promedio de  $14.08 \pm 0.05$  y valores promedio de Grasa de  $4.39 \pm 0.048$  y proteína de  $3.92 \pm 0.07$ .



# » COSTEÑO CON CUERNOS (CCC)

Por su formación en la región Caribe esta raza tolera fuertes temperaturas y variaciones de humedad del medio ambiente; por eso su adaptación a las zonas de las ciénagas de Córdoba y Magdalena o en las sábanas secas de Sucre y Bolívar. Este es un animal de tamaño mediano, con una alzada a la cruz entre 129 a 139 cm en los machos y en hembras de 123 a 127 cm, con un color que va del bayo claro al rojo cereza; presenta un tren posterior poco estrecho e inserción de la cola alta y en las vacas se evidencia la estructura de producción lechera.

En cuanto a características productivas, se han registrado para el núcleo que conforma el Banco de Germoplasma en el C.I. Turipaná, los siguientes parámetros en general para machos y hembras: Peso al nacer de  $28,76 \pm 3,3$  kg, peso al destete de  $174,94 \pm 22,95$  kg y peso a los 16 meses de  $230,08 \pm 26,84$  kg. En cuanto a caracteres reproductivos, se han registrado valores de edad al primer parto de 37,1 meses con un intervalo entre partos de  $445,51 \pm 159,7$  días. Esta es una raza que originalmente ha sido de aptitud lechera, tanto pura como en cruzamientos



## » HARTON DEL VALLE (HV)

---

También tuvo su origen en los bovinos ibéricos traídos por los españoles al Valle del Cauca. Al parecer esta raza puede estar conformada por razas como la Rubio Gallega, la Asturiana de los valles, y la Mayorquina. Los Hartones del Valle, son medianos, de color amarillo claro al rojizo y con mezcla de pelos negros rodeando el hocico, periné o formando barcinaduras, con pezuñas y mucosas pigmentadas y buen desarrollo muscular.

Dentro de las características sobresalientes se pueden mencionar la facilidad de las hembras al parto y la adaptabilidad al trópico. Los ejemplares de esta raza crecen hasta los cinco años, tienen buena fertilidad, una gran alzada y pueden llegar a tener 1,5 m de altura. Los toros tienen un prepucio corto que evita que se infecte.

Las canales de estos animales dan un rendimiento del 53% en frío y el marmóreo es excelente, lo cual significa que es una carne de gran calidad. De la leche se resalta su contenido de grasa,  $3,72 \pm 0,01\%$ , una proteína del  $3,59 \pm 0,05\%$ , y unos sólidos totales con más del  $12,94 \pm 0,05\%$ . Se han registrado lactancias de 1.683 kg para un período de 284 días en un ordeño con apoyo del ternero. En cuanto a las características de crecimiento, se reportan pesos al nacer de  $35 \pm 5,7$  kg en machos y  $31 \pm 4,6$  kg en hembras, con pesos al destete de  $178 \pm 27,6$  kg y  $165 \pm 20,4$  kg para machos y hembras, respectivamente; con ganancias diarias de peso de 582,5 g para machos y 546,1 g para hembras. Las vacas normalmente producen una cría anualmente, con una edad de 36 meses al primer parto, con intervalos de 360 y 390 días.



## » SAN MARTINERO (SM)

Se considera que el ganado Sanmartinero se derivó del bovino español de Extremadura y que la entrada a los Llanos Orientales tuvo lugar entre los años 1555 y 1570. Las condiciones medioambientales predominantes en el área de influencia del SM son de bosque húmedo tropical con topografía plana y temperatura promedio de 26 °C. La alzada de la cruz es de 1,30 m para hembras y 1,35 m para los machos. El color del pelo va del bayo hasta el hosco pero también se pueden encontrar animales negros y pardos. En cuanto a las características productivas se hallan pesos al nacimiento de 27,4 y 26,1 kg, pesos al destete de 171 y 161 kg y pesos a los 16 meses de 232 y 215 kg, para machos y hembras respectivamente. Como línea paterna, presenta también una buena habilidad combinatoria, produciendo teneros con mayor adaptación y por ende disminuyendo la mortalidad perinatal y aumentando la cantidad de kilogramos al destete, que puede llegar a los 190 kg.

Para caracteres productivos se ha encontrado valores de intervalo entre partos de 469 días, con una edad al primer parto de 28 meses y un porcentaje de natalidad del 75,4%. En cuanto a producción láctea, se han registrado valores de duración de lactancia de 240 días y con producciones promedio de 779 kg de leche, con un porcentaje promedio de grasa de  $3.43 \pm 0.03\%$ , sólidos totales de  $13.24 \pm 0.04$ , porcentajes de proteína de  $3.93 \pm 0.006 \%$ , lo que indica su buena aptitud láctea.



# » CASANAREÑO

Esta raza es propia de la altillanura mal drenada de los Llanos Orientales colombianos, originada de los animales provenientes de Venezuela, y que se ubicaron en la margen superior del río Meta. Esta es una raza rústica, que sobrevive en zonas inundables la mayor parte del año, longeva, resistente a parásitos y enfermedades. Se puede considerar de tipo longilíneo, concavilíneo de porte mediano, con una gran variedad de colores que van desde el bayo claro hasta los barcinos y tostados, en razón a que nunca fueron uniformizados por color y actualmente casi cualquier coloración es aceptada.

Esta es la raza más liviana de las criollas; Salamanca A. (1999) reporta pesos al nacimiento de 20,5 y 18,5 kg y pesos al destete a los 7 meses de 163 y 146 kg y pesos adultos de 550 y 380 kg para machos y hembras respectivamente. En cuanto a producción de leche se han registrado lactancias que van de 750 a 1.080 litros. Con una duración de 180 a 270 días produciendo un ternero cada 365 días.



# RAZAS CRIOLLAS

ROMOSINUANO, BLANCO OREJINEGRO, COSTEÑO CON CUERNOS,  
HARTON DEL VALLE, SAN MARTINERO, CASANAREÑO



Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria

Línea de atención al cliente: 018000121515

[atencionalcliente@corpoica.org.co](mailto:atencionalcliente@corpoica.org.co)

[www.corpoica.org.co](http://www.corpoica.org.co)

CUI: 1419 CA: Convenio-211



**MinAgricultura**  
Ministerio de Agricultura  
y Desarrollo Rural



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**