BAC
MODULO DIGITAL

Corpoica
El documento fuente se encuentra en
La Biblioteca Agropecuaria de Colombia

## ELEMENTOS BIBLIOGRAFICOS

AUTOR (ES): Gómez Soler, J.; Stonaker, H.H.; Lozano, O.; Salazar Cruz, J.J.
TITULO: Manejo de toros en una monta contínua
FUENTE: 10. Congreso Nacional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Medellín (Colombia), 7-11 Dic 1976. Memorias. Medellín (Colombia), COLVEZA, 1977. p. 136-137

# MANEJO DE TOROS EN UNA MONTA CONTINUA

**Juvenal Gómez**
**H. H. Stonaicer**
**Orlando Lozano**
**'Jairo Salazar**

En el Centro Experimental de Carimagua propiedad del ICA, situado en los Llanos Orientales, se realizó un experimento de monta continua utilizando 8 toros de la raza Cebú (T .C.) y 8 de la raza criolla San Martinera (T.Sm), que sirvieron 8 hatos de hembras Cebú prin - gado compuestos de 34 animales c/u.. Los toros de cada raza se *rotaron en los hatos por períodos durante la monta, cambiando de ra* za cada 28 días. El ensayo se inició el primero de Mayo de 1.973 y los datos tabulados corresponden a 53 semanas de monta del (T .C.) y 52 semanas de monta del (T . Sm. ) . De las 272 hembras apareadas 68 pastorearon sabana nativa de Trachypogum, Paspalum, Andropogum y Leptocoryphium más sal (Grupo 1), 68 en la sabana nativa más minerales (Grupo II), 68 en la sabana nativa en verano y sabana mejorada con pasto Chopín Melinis minutiflora en invierno más minerales (Grupo III) y 68 en sabana mejorada con pasto Chopín más minerales (Grupo IV). Durante éste lapso se registraron 435 nacimientos delos cuales 220 terneros eran hijos del (T.C.) y 215 del (T.Sm.), 10 cual arrojó un porcentaje de efectividad del 50.6 y 49.4 respectivamente ,

Comparando los dos años de apareamiento se encontró que en el primer año el (T .C .) fué efectivo en el 48.4% y el (T.Sm.) ene151.6 % y en el segundo año fué el 52.5% y 4'7 .5% respectivamente. Con respecto a las vacas del Grupo I el (T .C .) fué efectivo en 36 .6% y el (T.Sm.) en 63.4%, en las del Grupo II, 62.3% y 37.7% en las del grupo III, 48.8% y 51 .6% en las del Grupo IV la efectividad fué igual respectivamente. No se encontró ventaja significativa en la totalidad del servicio de monta del toro Cebú sobre el toro San Martinero, sin embargo, se observó que el toro San Martinero bajo condiciones marginales de alimentación fué más eficiente.