Calidad de la leche: compromiso de todos

La leche proveniente de cuartos con mastitis afecta su calidad composicional, disminuyendo su valor nutricional, y su aptitud para procesos industriales y disminuyendo su rendimiento. Lo anterior, unido a la notable disminución del volumen de leche, genera cuantiosas pérdidas económicas para los productores y los industrializadores del vital alimento.

Es por esto que la industria lechera a nivel mundial ha establecido niveles máximos para los Recuentos de Células Somáticas (RCS), los cuales indican el grado de sanidad de la glándula mamaria de bovinos y bufalinos. Aunque la normatividad colombiana no incluye los RCS en el esquema de pago de la leche cruda al productor, Resolución 017 de 2012 del MADR, Colanta BONIFICA VOLUNTARIAMENTE a sus asociados la leche con menos de 300.000 RCS/mililitro y le propone a sus proveedores, Asociados y no asociados, el envío a La Cooperativa de leche con menos de 700.000 RCS/mililitro de leche.

Para el efecto, recomienda las siguientes medidas:

1. **Descarte y examine los primeros chorros de leche en un recipiente de fondo oscuro.**
2. **Descarte la leche de cuartos con MASTITIS CLÍNICA.**
3. **Realice chequeos de mastitis CADA 8 DÍAS.**
4. **Descarte la leche de cuartos con MASTITIS SUBCLÍNICA GRADO 3.**
5. **Descarte las vacas con MASTITIS CRÓNICA resistente a todo tipo de tratamientos realizados.**
6. **Seque las vacas con MASTITIS SUBCLÍNICA GRADO 3 con 5 meses o más de gestación y/o que produzcan menos de 8 litros diarios de leche.**

A corto plazo

Tome muestras de leche de cuartos con mastitis subclínica persistente para realizar CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA y definir procedimientos.

Permanentemente

Establezca en su hato un PROGRAMA INTEGRAL DE CONTROL DE LA MASTITIS BOVINA.