Para el control de pudriciones en el cultivo de la Papa y Hortalizas

J. Mauricio Maldonado*

Mertect el Fungicida Versátil

Mertect es un fungicida versátil, de amplio espectro, sistémico, altamente efectivo contra un amplio rango de hongos patógenos.

Mertect resiste la acción de los agentes atmosféricos. Cuando es utilizado de acuerdo a las dosis recomendadas, Mertect no es dañino a los tejidos de las plantas, a los animales o a los humanos; no ha sido tóxico a las abejas y no es peligroso para los peces y la fauna silvestre.

La formulación de Mertect es estable, fácil de manejar, fácil de usar y tiene demostrado desempeño en el campo. Además, la formulación de ha sido irritante a los trabajadores en el campo ni en las empacadoras y no deja sabores, olores ni residuos desagradables en los cultivos tratados.

Un insuperable Márgen de Seguridad

Mertect, como un fungicida agrícola, es un producto cuidadosamente investigado en sus aspectos toxicológicos comparado con muchos otros agroquímicos. El tiabendazol, el ingrediente activo del Meterct, fue reconocido en un comienzo como un producto medicinal para humanos y un sobresaliente antihelmíntico de amplio espectro para animales. Poco después se comprobó su alta efectividad contra una amplia variedad de enfermedades causadas por hongos en vegetales, frutas, cultivos extensivos, ornamentales y pastos.

* Biólogo. Jefe de Servicios Técnicos Agrícolas. División MSD. AGVET

Eficacia

Mertect es altamente efectivo contra ***Fusarium*** spp y ***Phoma*** spp, hongos causantes de pudriciones en el cultivo de la papa.

Mertect es altamente efectivo contra el ***Colletotrichum graminicola***, hongo causante de la Antracnosis y contra ***Ascochyta*** sp, hongo causante de la Ascoquita en los cultivos de fríjol, arveja y habichuela.

Aplicación en Papa

Aplique Mertect en la dosis de 400 cc/100 litros de agua en tratamientos de inmersión o 1 litro /20 litros de agua en tratamientos de aspersión, aplicando 2 litros de la suspensión por tonelada de papa, antes del almacenamiento y secado. Aplíquese el tratamiento inmediatamente después de la cosecha y antes de almacenar los tubérculos para consumo o semilla, o aplicar a la semilla de papa antes de la siembra.

Para preparar el caldo de aspersión (mezcla de Mertect con agua) agregue la cantidad recomendada de Mertect al volumen de agua requerido y agite.

Cultivo	Enfermedades	cc./100 lt Agua	lt/20 lt Agua
Papa	Pudriciones	400 por inmersión	1 por aspersión

Aplicación: Frijol, Arverja - Habichuela

Aplique Mertect en la dosis de 750 cc/Ha o 1 cc/1 litro de agua cuando aparezcan los primeros síntomas de las enfermedades.

Para preparar el caldo de aspersión (mezcla de Mertect con agua), agregue la cantidad recomendada de Mertect al volumen de agua requerido y agite la cantidad de caldo utilizado por hectárea en las aspersiones debe garantizar una cobertura óptima del cultivo, lo cual depende del método de aplicación, área foliar del cutivo, condiciones climáticas y otras de menor importancia.

Cultivo	Enfermedades	Litros/hectárea	cc/ 1 lt Agua
Fríjol Arveja Habichuela	Antracnosis Ascoquita	0.750	1

Es sumamente importante agitar fuertemente el envase original durante suficiente tiempo para lograr la homogenización completa de su contenido antes de utilizarlo en la preparación del caldo de aspersión.

Para una información más completa de las instrucciones de aplicación y precauciones de uso, lea y siga cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta.