AGROSAVIA
Corporación colombiana de investigación agropecuaria

MODELO PRODUCTIVO DE TOMATE BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MANEJO AGRONÓMICO

PRÁCTICAS CULTURALES

DENSIDAD DE SIEMBRA



Se usan densidades de siembra entre 11.106 hasta 30.333, siendo la más recomendable: 22.727 plantas por hectárea.

TRASPLANTE

El trasplante se realiza a los 30 días de estar en semillero.

Nota:
Se debe realizar la aplicación de enmiendas, basada en resultados de análisis de suelos antes del trasplante.

TUTORADO

El tutorado es el sistema de soporte de la planta.



Recomendaciones

- Usar fibra de polietileno calibre 9.000 (preferiblemente color verde).
- Usar argollas y ubicarlas por debajo del peciolo de una hoja completamente desarrollada.



PODAS

- Potencian zonas de producción.
- Ayudan a mejorar aireación.

Poda de formación

Define el número de tallos a desarrollar.



Poda yemas o chupones

Elimina brotes que se desarrollan en la inserción entre el tallo principal y las hojas.

Poda de flores y frutos

Elimina frutos deformes, enfermos y pequeños.



Poda de hojas

Mejora la entrada de luz y ventilación.



Poda terminal

Tiene como objetivo suspender el crecimiento de la planta.



Modelo Productivo

Portafolio de Oferta Tecnológica

Contacto:
atencionalcliente@agrosavia.co
018000121515
(+57 601)4227300