Evitemos la propagación de la Brucelosis

Por: Zoot. Juan M. Cerón A.
Director División Agropecuaria
juanca@colanta.com.co

M.V. Manuel G. Jaramillo V.
Jefe Asistencia Técnica Colanta
manueljv@colanta.com.co

El ICA emitió la Resolución 30392 del 21 de agosto de 2018 con la cual se declara en cuarentena por Brucelosis a diez municipios de la cuenca lechera de Antioquia.

La Brucelosis ha estado presente en la ganadería colombiana y es indispensable que tomemos acciones para controlar su propagación hasta que logremos su erradicación nacional.

En los ganados, esta enfermedad es causada por la *Brucela abortus*, que genera grandes pérdidas económicas en las fincas pues, con ganados infectados, la cantidad de abortos es considerable. Las ineficiencias reproductivas y productivas incrementan los costos de producción y disminuyen la rentabilidad de los hatos lecheros.

Colanta ha impulsado la campaña de vacunación contra Brucelosis Bovina, con Cepa 19 y recientemente con la vacuna RB 51. En 2007, fue pionera en Colombia con la bonificación de la leche proveniente de hatos libres de Brucelosis, campaña que asumió también el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con impacto nacional al incluirla en la resolución 017 de 2012, bonificando 10 pesos por litro de leche. Hoy la bonificación es de 14,5 pesos.

En sistemas lecheros especializados esta bonificación permite asumir la totalidad de los costos para certificar fincas como hatos libres de brucelosis y generar utilidad para los productores.



Hasta 2014 esta bonificación fue la principal motivación de los ganaderos para certificar sus hatos. En Colanta se alcanzó 7.495 predios certificados por Brucelosis, Tuberculosis y Buenas Prácticas Ganaderas, a los cuales se les entregó 67.268 millones de pesos desde 2007.

Desafortunadamente, a partir de 2015 se incrementó la cantidad de animales positivos a Brucelosis, lo cual significa que la campaña y medidas de seguridad implementadas no fueron suficientes para controlar la propagación de la enfermedad. Ante el temor de los ganaderos de tener que implementar programas de saneamiento en sus hatos, muchos han decidido abandonar el programa de hatos libres, lo cual es un retroceso gigante ante el propósito de alcanzar una región y un país libre de Brucelosis Bovina.

Urge que, adicional a la cuarentena establecida por el ICA, se adopten medidas adicionales para frenar el avance de la enfermedad y así retomar la senda del control.

Finalmente, se requiere que los productores tomen consciencia que el control de la brucelosis debe hacerse para evitar las pérdidas económicas en sus fincas y por el estatus sanitario de la región y el país.

Deben implementarse nuevas herramientas que hoy son ampliamente utilizadas en varios países del mundo para el diagnóstico y monitoreo de la enfermedad que permitan, de una manera práctica y económica, identificar en qué predios hay animales positivos y concentrar todos los esfuerzos para su eliminación.