BAC
MODULO DIGITAL

Corpoica
El documento fuente se encuentra en
La Biblioteca Agropecuaria de Colombia

ELEMENTOS BIBLIOGRAFICOS

AUTOR (ES): Ochoa, O.; Tróchez Parra, A.L.
TITULO: Control de plagas en el cultivo del algodonero en el Valle del Cauca
FUENTE: Sociedad Colombiana de Entomología, Cali (Colombia). 9. Congreso Sociedad Colombiana de Entomología, Cali (Colombia), 21-23 Jul 1982. Resúmenes del 9o. congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología. Cali (Colombia), SOCOLEN, 1982. p. 51

CONTROL DE PLAGAS EN EL CULTIVO DEL ALGODONERO EN EL VALLE DEL CAUCA

Oscar Ochoa [1)]
Adolfo L. Tróchez P. [1)]

En el presente trabajo se presenta una relación de los productos y dosis utilizados por los asistentes técnicos en el cultivo del algodonero durante los años de 1980 y 1981 en el Valle del Cauca. El promedio general de aplicaciones para 1980 fué de 3,52 y para 1981 de 2,57, sin incluir las aplicaciones de feromonas para el control del gusano rosado de la India, que se hicieron en algunos cultivos. Las plagas contra las cuales se hicieron estas aplicaciones fueron: Alabama argillacea (Hubner), Aphis gossypii Glover, Acaros fitófagos, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), Heliothis virescens (F.), Pectinophora gossypiella Saunders y en la temporada de 1981 en algunas zonas contra el Sacadodes pyralis Dyar.

En el Valle del Cauca durante 1980 y 1981 más del 90% de agricultores liberó Trichogramma sp.