Características de las microrregiones del VALLE DEL SINÚ Y BAJO CAUCA

Microrregión Valle del Sinú. Esta localizada entre los 7° 57′ y 9° 27′ de latitud norte y 76° 27′ y 75° 35′ de longitud oeste del meridiano de Grenwich en el departamento de Córdoba, tiene una extensión de 763.170 hectáreas y está conformada por los municipios de Tierralta, Valencia, Los Córdobas, Canalete, Montería, San Carlos, San Antero, Planeta Rica, Cienaga de Oro, Cereté, San Pelayo, Lorica, Puerto Escondido, Moñito, Purísima, Tuchín, Chimá, Momil, San Bernardo de Viento y Cotorra . Los sistemas de producción bovina ocupan 712.453 has, presenta una cobertura vegetal con predominio de pastos distribuidos en 365.421 has de praderas mejoradas de las especies Braquiaria decumbens, dictyoneura y mutica; ángleton, guineas y estrella, en el resto del área predomina el colosuana y algunos rastrojos. Predomina el clima sub húmedo y húmedo tropical, con precipitaciones mensuales que oscilan entre 110 y 182 mm, el promedio anual en el norte se calcula en 1.000 mm y más de 2.000 mm hacia el sur, la tempe-

ratura promedio es 28ª C y la humedad relativa es de 80% (Pulido y otros 2002).

Microrregión bajo Cauca. Está localizada entre los 7° 14′ y 8° 34′ de Latitud Norte y 76° 2′ y 74° 35′ del meridiano de Greenwich, tiene una extensión de 1.374.598 has y esta conformada por los municipios de Cáceres, Caucasia, Taraza, Ayapel, Buena Vista, Nechí, Montelíbano, la Apartada, San José de Uré, Planeta Rica, Puerto Libertador y Pueblo Nuevo. La precipitación anual varia entre 1.000 y 3.000 mm, el periodo de mayor pluviosidad se concentra entre los meses de abril y noviembre, la temperatura y la humedad varían con al altura; en algunas áreas la pendiente es superior al 85%. Presenta una cobertura vegetal con predominio de pastos mejorados en 546.790 has, de especies como *Braquiaria decumbens*, *B. humidicola, B. plantaginae* (braquipará), *B. arecta* (urare) y *B. mutica* (pará); *Echinochloa polistachia* (alemán), *Dichanthium anulatum* (climacuna), y *Dichanthium aristatum* (angleton). El sistema de producción bovina predominante es la cría seguida del doble propósito y la ceba. El componente genético se basa en cruces de Cebú por criollo, Pardo Suizo, Holstein, Simmental y Gyr entre otros (Pulido y otros, 2002).