BAC
MODULO DIGITAL

Corpoica
El documento fuente se encuentra en
La Biblioteca Agropecuaria de Colombia

ELEMENTOS BIBLIOGRAFICOS

AUTOR (ES): Gómez Triana, A.; Morrison, R.B.; Navarrete Suárez, M.G.; Orjuela J, J.
TITULO: Producción de leche en el departamento de Córdoba
FUENTE: Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de Santander, Bucaramanga (Colombia). 15. Congreso Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Bucaramanga (Colombia), 8-12 Oct 1986. Resúmenes del 15 congreso nacional de medicina veterinaria y zootecnia. Bucaramanga (Colombia), COLVEZAN, 1986. p. 134

PLANTRA II ANALIZADO Oliver 530

PRODUCCION DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Andrés Gómez T., DMV.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, PROGRAMA DE MICROBIOLOGIA, LABORATORIO DE INVESTIGACIONES MEDICAS VETERINARIAS (LIMV) A.A. 29743 BOGOTA.

ROBERT MORRISON, DMV. Ph.D. Experto FAO.
MARIO NAVARRETE S., JAIME ORJUELA J. I.C.A. LIVET - A.A. 206 MONTERIA.

Existe muy poca información disponible sobre la producción de leche por fincas o por vaca en el departamento de Córdoba. El proyecto Colombo Alemán ha venido estudiando la interrelación entre salud, manejo y producción en hatos típicos en esta área del país. Inicialmente se efectuó un estudio preliminar "survey" en 104 fincas para estudiar parámetros de rendimiento (tales como producción de leche.) Subsecuentemente se seleccionaron 12 fincas las cuales han sido visitadas mensualmente desde enero de 1984. Del "Survey" los ganaderos proporcionaron la información sobre la producción de leche. La leche promedio producida por vaca fué de 2.5 lt/día con un rango de 0,8 - 6,1 lt/día. La producción de enero a mayo (época seca) fué de 1,8 lt/vaca/día, la cual fué significativamente más baja que la observada de junio a diciembre (2,6 lt/vaca/día). Hatos con sangre cebú o cruces de cebú con criollo como razas predominantes, tuvieron un promedio significativamente más bajo que el resto de hatos con razas combinadas. Esta observación se basó en la composición genética de las vacas y toros. El ingreso por venta de leche en relación con el ingreso total en fincas pequeñas, medianas y grandes fué de 50,36, y 5o/o respectivamente. La curva de lactación fué aproximadamente lineal comenzando con 3.2 lt/vaca/día. De las 12 fincas en la fase de seguimiento, el promedio producido vendido fué aproximadamente 817 lt por 10 meses promedio de lactación.

Es evidente que en Córdoba muchos ganaderos quieren aumentar la producción de leche en sus hatos. La experiencia de otros países demuestra que este deseo trae como consecuencia una gran necesidad de aumentar los servicios veterinarios; muy probablemente se va a presentar lo mismo en Córdoba.

Producción de Leche en el Departamento de Córdoba.

a b c c

Gómez, T.A., Morrison, R.B., Navarrete, M., Orjuela, J.

a. ICA-LIMV, A.A. 22743 Bogotá,
b. ICA-LIVET, A.A. 206, Montería, Asesor de FAO
c. ICA-LIVET, A.A. 206, Montería,

1. Schellenberg, R., & Weniger, J.H. Sistemas de Producción de Leche y Carne en la Costa Atlántica de Colombia. Promegan Informe Técnico No.5, GTZ, Eschborn, Federal Republic of Germany, 1985,1-217
2. Neidhart, R., Plasse, D., Weniger, J.H., Verde, O., Beltrán, J., Benavides, A. (1976). Milk yield of Brahman cows in a tropical beef production system. Journal Animal Science, 48:1-1.
3. Morris, R.S. (1969). Assessing the econmic value of veterinary services to primary industries. Australian Veterinary Journal, 45:295 - 300.