TUBERCULOSIS BOVINA

Guillermo Aparicio J.

RESUMEN:

Se afirma que hasta hace un (1) año, la tuberculosis bovina no era un problema que inquietara a las autoridades de Salud- Se respalda este acerto con varios estudios realizados en el país en mataderos de varias ciudades importantes, en los estudios de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias y en un estudio de tesis muy bien realizado, en que se manifiesta que nunca se ha encontrado esta enfermedad en el ganado: además de los cultivos realizados en cerca de 10.000 casos de tuberculosis pulmonar, humana en Bogotá nunca se ha aislado el M. bovis.

Se aclara la conclusión del estudio realizado por la academia Colombiana de Ciencias Veterinarias en 1.970, en el sentido de que la única cepa de Micobacterias que se pude aislar, se identificó posteriormente como Micobacteria bovina.

Se relata el aislamiento de una cepa de Micobacteria bovis, realizado en el Laboratorio de Tuberculosis del Hospital Santa Sofía de Manizales, de un toro importado de Europa y de una cepa aislada en el Laboratorio de Tuberculosis del Instituto Nacional de Salud, de una orina de un paciente Europeo, a quien le habían extirpado el riñon - por tuberculosis renal, 20 años atras.-

Se relatan los estudios bacteriológicos e histopatológicos, realizados en tres (3) animales sacrificados en el matadero de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional a fines de 1.976 y comienzos de 1977 tanto en el Laboratorio de Tuberculosis del Instituto Nacional de Salud como en los Laboratorios del LIMV. y la confirmación del aislamiento de una micobacteria identificada como M. bovis, en el Laboratorio de Tuberculosis del Instituto Nacional de Salud y en el Centro Panamericano de Zoonosis.-